



人類乳突狀病毒檢查(HPV Testing)

人類乳突病毒(HPV)是一種非常微小的去氧核糖核酸(DNA)病毒，通常 HPV 感染子宮頸後 7-8 個月之後會自動消失，但有少部分患者會持續感染，並且於之後 10-20 年間，發生高度癌前病變，如：子宮頸癌。

而人類乳突病毒篩檢試驗(HPV Testing)可以偵測出高危險種類的人類乳突病毒，其中子宮頸癌人類乳突狀病毒核酸檢驗試劑有 15 種與子宮頸癌有關的病毒探針試劑，即所謂的致癌的高危險羣，其中以第 16、18 型最為常見，約占 7 成感染率，其他如 52、58、31、33 型則約占 3 成。此外少數的低危險羣，如第 6、11 型，則可能引起尖性濕疣(俗稱菜花)，或輕度子宮頸病變。目前並無針對病毒本身的治療，但是對於病毒感染後所造成的尖性濕疣(菜花)、子宮頸癌前細胞病變是可以治療的。

什麼人需要檢查？

1. 年滿三十歲，曾有性經驗，可同時作抹片檢查與人類乳突病毒篩檢。
2. 三十歲以下曾有性經驗女性，感染人類乳突病毒非常常見，但子宮頸癌在這個年齡層卻非常少見，是因為通常這個年齡層感染的病毒沒有症狀且常會自動痊癒或消失，通常單一病毒檢查對此年齡層的女性是無意義的，通常需配合抹片檢查，若抹片檢查結果為『不正常但重要性未知的鱗狀上皮細胞』(ASCUS)的異常，可進一步做病毒檢查，以判斷是否因人類乳突病毒感染所發生的病變，或者是發炎所造成的異常。
3. 目前也作為有過性行為者，欲施打子宮頸癌疫苗前的病毒檢測，以發揮疫苗最大效用。

檢查前注意事項

1. 不要在經期間排檢查。
2. 做檢查前 48 小時勿做陰道灌洗，避免性行為，避免使用棉條、殺精泡沫、潤滑液或是陰道塞劑
3. 採檢過程檢體採樣的方式與抹片相同，小刷子在子宮頸上輕取少量剝落的上皮細胞，送實驗室做人類乳突病毒檢測。

由於人類乳突病毒檢查(HPV Testing)只能偵測病毒，無法直接看到細胞變化，因此婦女仍應定期接受子宮頸抹片檢查，以期早期發現，積極治療。

你的健康 是寶貝的希望
讓我們守護你的健康