



性病診斷與篩檢

性病指的就是經由性接觸所傳染的疾病，狹義上來說傳統性病是指經由性交接觸到某些特定的細菌或病毒，引起男女性生殖器或泌尿道的疾病，例如梅毒、淋病等，而廣義上來說性病除了經由性接觸傳染之外，也可經由其他途徑感染，對身體的影響也不僅止於生殖泌尿系統，如 B 型肝炎、愛滋病等。預防性病最好的方法就是安全的性行為，單一性伴侶、避免高危險性交方式、保持會陰部清潔以及最重要的使用保險套等，能夠降低性病感染的機率，若已感染則性伴侶也需共同接受治療避免重複感染。

性病的致病原

- ◆ 細菌：梅毒螺旋體造成梅毒；淋病雙球菌造成淋病
- ◆ 黴菌：白色念珠菌造成陰道炎、尿道炎
- ◆ 寄生蟲：陰道滴蟲造成陰道炎、尿道炎
- ◆ 病毒：人類乳突病毒造成尖形濕疣(菜花)；疱疹病毒造成單純疱疹；人類免疫不全病毒造成愛滋病

感染性病的症狀

依據致病源不同，臨床症狀也會不同，以下舉一些例子：

- ◆ 淋病：陰道、尿道疼痛或有異常分泌物
- ◆ 梅毒：陰道滴蟲生殖道、生殖器潰爛、下疳淋巴腺種大、泌尿道疣狀物（第二期梅毒）
- ◆ 疱疹：花柳性淋巴肉芽腫生殖、泌尿器官疹
- ◆ 尖形濕疣(菜花)：泌尿道疣狀物

性病的後遺症

性病若未經治療可能產生的後遺症有

1. **尿道狹窄**：由於屢次的尿道發炎、潰瘍、尿道組織終被纖維組織取代，由於疤痕收縮而造成尿道狹窄。
2. **不孕**：例如淋病在男性可能會波及攝護腺，甚至副睪丸，造成發炎而導致不孕，女性也可能因為波及子宮頸、輸卵管，造成阻塞，而有不孕或子宮外孕的問題。
3. **陽萎性冷感**：由於罪惡感、厲害的症狀、擔心傳染給配偶，這些都會影響心理及生理，造成性功能障礙，甚至因懷疑，不貞而走上離婚之路。
4. **心臟、血管炎、關節炎**：有 10% 未經治療的梅毒病患會有主動脈發炎、冠狀動脈疾病或心臟瓣膜閉鎖不全，淋病病患也可能影響關節及心臟造成關節炎及心內膜炎。
5. **遺傳胎兒**：梅毒螺旋體會穿過胎盤，影響胎兒造成先天性梅毒，淋菌性陰道炎也會因胎兒自產道產出而有結膜炎等，而新生兒會因母親陰道有生殖器疱疹而發生發燒腹瀉及皮膚病灶。
6. **導致腫瘤**：根據研究淋巴性肉芽腫及尖形濕疣因長期、慢性的陰莖炎，女性外陰發炎，刺激而與陰莖之鱗狀上皮細胞癌及女性子宮頸癌、外陰癌有相當密切的關係。

你的健康 是寶貝的希望
讓我們守護你的健康



常見性病診斷及治療

梅毒

梅毒是經由性交時皮膚或黏膜接觸到梅毒螺旋體而感染，第一期梅毒通常在性行為感染後 2-4 星期，生殖器官會有潰瘍情形，此時壓迫潰瘍並無痛感；第二期梅毒由數週至數月不等，發病時會全身起疹子、發燒、關節股頭痛等；第二期梅毒如不治療，一年或數年後會進入晚期梅毒，此時梅毒螺旋體可能會侵犯心臟、血管、關節及神經系統等。

診斷：梅毒的診斷除了內診視診外，最確切的診斷還是在潰瘍處沾取樣本，利用暗視野顯鏡下觀察或用螢光抗體檢查法看是否有梅毒螺旋體，當然也可抽血藉由梅毒血清或者螺旋體凝集試驗來診斷。

治療：梅毒的治療一般是以肌肉注射盤尼西林為主，第一期 240 萬單位，第二期 480 萬，第三期 980 萬單位，一次注射即可，如果對盤尼西林過敏可以口服四環素 500 毫克每日 4 次或紅黴素 500 毫克共 2 週，一般預後都不錯，復發情形也不多見，但如果真的復發，則必須給予更密集的盤尼西林治療。

淋病

淋病的致病原是淋病雙球菌，而男性的尿道是最常發生感染的地方，咽喉也可能因口交而波及，同性戀的患者除了咽喉外，直腸也是另一個易感染的部為。根據統計，如果男性與有淋病的女性發生性行為，感染的機會大約 17-20%，而女性與男性淋病患者性交，得到淋菌尿道尿的機會卻高達 80%。

一般而言，淋病的潛伏期大約 3 - 10 天，但也有早到性交後 1 2 個小時或遲至 3 個月才發病，典型的淋菌性尿道炎會出現排尿時尿道疼痛、灼熱，合併黃色或棕色的尿道分泌物，尿道口會變的紅腫，陰莖有壓痛感，未經治療尿道炎會持續 3 - 7 週，而在三個月後 95% 的男性病患會無症狀。

診斷：淋菌性尿道炎的診斷其實不難，除了典型的尿道炎症狀外，可以由實驗室的檢驗而得知，方法是病患解尿後 1-4 小時內用特殊拭棒放入尿道獲取檢體，檢體一部份直接作染色檢查如果發現有淋病雙球菌存於白血球內便可獲得診斷，也可以將取得的尿道分泌物作細菌培養而得知，其他抽血檢驗測淋菌酵素、抗原、DNA 等亦可。

治療：近年來由於濫交或性伴侶增多，往往使得淋菌本身也發展出抗藥性或能分解盤尼西林，使得以往第一選擇藥物一盤尼西林無效而必須改用其他肌肉注射藥物如第三代頭孢子黴素，加上口服杜西黴素 100 毫克 7 天。一般而言，如果治療得當，尿道分泌物可在 12 小時內消失。有 15 - 30% 的病患合併有披衣菌感染，又未服用足夠天數，便可能持續會有薄而清的尿道分泌物，這類病患應用治療披衣菌感染方繼續治療才可。

尖形濕疣(菜花)

俗稱菜花，取其形狀像花菜而得名，它是一種病毒感染，主要是接觸到有“人類乳頭病毒”的性伴侶而罹患的，近年有增多的趨勢，菜花常見於性生活頻繁的年輕人，它的潛伏期可以從幾個禮拜到幾個月不等，有人甚至可以幾年都不發病。

診斷：典型的病灶在男性而言，是在包皮、冠狀溝、陰莖、龜頭或尿道口上長些粉紅色或淺白色的疣狀物，可以單個或多個，也可以一顆顆的，也有些會聚合在一起，女性患者出現的部位以大小陰唇，陰道口居多，但也可能波及到肛門周圍及會陰部份，無論男女菜花多會伴隨搔癢，灼熱的感覺，尖形濕疣不像梅毒，疱疹，可以以抽血檢驗方式而得以輔助診斷，它完全是要靠泌尿科或婦產科醫師對於病灶的特徵，病人的病史有充分的了解，才能獲得正確的診斷。

治療：尖形濕疣的治療，一般可用點藥，電氣燒灼或手術切除方式來處理，如何選擇處理的方式端視菜花的部位、大小、多寡及醫師的喜好而定，尿道內的菜花則必須以內視鏡直視下做燒灼來治療，最近幾年由於鐳射在醫學上的應用，也可以用二氧化碳鐳射光來作燒灼，其他如使用干擾素也有學者建議使用，但除了價格貴外還有些副作用，臨床上很少作為第一線治療藥，雖然菜花是種良性疾病，但是過去有許多研究証實它與男性的陰莖癌及女性子宮頸癌有密切關係，我們實在不能小看它。

你的健康 是寶貝的希望
讓我們守護你的健康